

「결핵진단서」 관련 변경사항 공지

2022.11.23. 주베트남대사관

사증 신청 시 제출하여야 하는 결핵진단서와 관련하여 변경된 사항을 다음과 같이 공지합니다.

○ 제출 대상

- 결핵고위험국가(베트남 등)의 국민이

① 한국에 90일을 초과하여 체류할 목적*으로 사증을 신청할 때

* 체류기간이 90일 이하라도 장기체류자격 사증을 신청하는 경우 포함

② 단기체류자격 중 계절근로자(C-4) 및 한국 체류 중인 외국인 결핵환자가 가족 등을 간병인으로 초청할 때

○ 면제 대상

- 임신부 및 만 6세 미만 소아

- 외교(A-1), 공무(A-2), 협정(A-3) 사증

○ 기본 제출 서류 : 결핵진단서 [서식 1]

- 대사관 지정기관(병원)에서 발급

※ 결핵진단서 유효기간 : 발급일로부터 3개월

- 위 ‘결핵진단서’에는 ①과거 결핵 치료력 문진, ②결핵 의심증상 문진, ③흉부X선 검사, ④객담(가래) 검사 결과를 기입

- 문진·검사는 [별첨] 결핵진단 절차도에 따라 수행

※ 문진 및 객담(가래) 검사 생략 여부는 검진기관이 판단

○ 입국금지자용 제출 서류 : 결핵 치료결과 확인서 [서식 2]

- 대사관이 비자 신청인(결핵으로 인한 입국금지자)에게 요구한 경우만 해당하며 대사관 지정기관(병원)에서 발급

○ 사증 발급기준 : 결핵으로 진단된 경우 사증발급 제한


○ 시행일 : 변경 사항은 2022년 12월 1일부터 사증 신청 시 적용

◇ 참고사항

○ 결핵고위험국가

- ① 네팔 ② 동티모르 ③ 러시아 ④ 말레이시아 ⑤ 몽골 ⑥ 미얀마
⑦ 방글라데시 ⑧ 베트남 ⑨ 스리랑카 ⑩ 우즈베키스탄 ⑪ 인도 ⑫
인도네시아 ⑬ 중국 ⑭ 캄보디아 ⑮ 키르기스 ⑯ 태국 ⑰ 파키스탄
⑱ 필리핀 ⑲ 라오스
⑳ 카자흐스탄 ㉑ 타지키스탄 ㉒ 우크라이나 ㉓ 아제르바이잔 ㉔
벨라루스 ㉕ 몰도바공화국 ㉖ 나이지리아 ㉗ 남아프리카공화국 ㉘
에티오피아 ㉙ 콩고민주공화국 ㉚ 케냐 ㉛ 모잠비크 ㉜ 짐바브웨
㉝ 앙골라 ㉞ 페루 ㉟ 파푸아뉴기니

[별첨] 결핵진단 절차도



< 결핵진단 절차 상세 설명 >

① 과거 결핵 치료력

- 현재 결핵 치료 중인 경우 "활동성 결핵 또는 결핵 의심"으로 판정

② 결핵의심 증상

- 2주 이상 기침, 열, 야간발한, 체중감소 등을 의미

③ 흉부 X선 검사


- 결핵의심 증상이 있는 경우 흉부 X선 검사 결과와 상관 없이 모두 객담검사를 시행
- 결핵의심 증상이 없으나, 흉부 X선 검사 결과 정상이 아닌 경우 객담검사 시행
- 결핵의심 증상이 없고, 흉부 X선 검사 결과 "정상(A)"인 경우는 "결핵환자 아님"으로 판정

④ 객담검사

- 객담검사는 1회에 24시간 이상 간격으로 총 3회 객담을 뱉어 검사
- 객담검사 일자에는 맨 첫 번째 채담일자를 기록
- 객담도말검사와 객담배양검사를 필수로 각각 3회씩 시행하며, 필요시 결핵균 핵산증폭검사를 추가로 시행 가능(선택)
- 객담검사 결과 "미량 검출(Trace)"인 경우는 "양성(Postive)"으로 판정
- 해당 국가에서 전반적으로 객담배양검사 시행이 불가능한 경우, 결핵균 핵산증폭검사로 객담배양검사 대체 가능(개별 의료기관에서 시행이 불가능한 경우가 아닌, 해당 국가 전반적으로 객담배양검사가 불가능한 경우를 의미)

- ⑤ 결핵이 의심되어 시행한 객담검사가 "음성"인 경우라도, 담당 의사가 임상증상과 흉부 X선 검사 결과 등을 종합하여 결핵이 강하게 추정된다고 판단하는 경우는 "활동성 결핵 또는 결핵 의심"으로 판정

Korea Pre-entry tuberculosis screening algorithm



< Description of TB screening instruction >

- ① **TB treatment history**
 - Interpretation as "active TB or suspected TB", if currently under treatment for tuberculosis.
- ② **Signs & Symptoms suggestive of TB**
 - Meaning cough, fever, night sweating, weight loss, etc. for more than 2 weeks.
- ③ **Chest X-ray**
 - Applicants with signs & symptoms, should perform sputum test regardless of the chest X-ray findings.
 - Applicants without signs & symptoms, but the chest X-ray findings are "cured or inactive TB" or "suspected active TB", should perform sputum test should be performed.
 - Interpretation as "No active TB", if applicants without signs & symptoms and the chest X-ray findings are normal.
- ④ **Sputum examination**
 - Three sputum specimens must be collected at least 24 hours apart
 - The date of sputum examination is recorded as the first specimens collect date
 - The sputum smear test and sputum *M. tuberculosis* culture test are required, and additional nucleic acid amplification tests for tuberculosis can be performed if necessary (optional)
 - Interpretation as "Positive", If the sputum examination result is "trace"
 - If the sputum culture test is generally impossible in the country, the sputum culture test can be replaced by the tuberculosis nucleic acid amplification test (which means that the sputum culture test is impossible in the country, not at individual medical institutions)
- ⑤ It is possible that interpretation as "Active TB or suspected TB", if the doctor determines that tuberculosis is highly suggestive by combining clinical symptoms and chest X-ray findings (Even if the sputum examination result is "Negative")